

Załącznik nr 3 do pisma nr WPN.6441.10.2013.AP z 12 czerwca 2013 r.

Gdzie, jak i kiedy wieszać skrzynki lęgowe na budynkach? (Źródło: "Ochrona ptaków gniazdujących w budynkach", Warszawski Oddział Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”).

Typ skrzynki	Gdzie wieszać?	Jak wieszać?	Kiedy wieszać?
A - wróbel	Najlepiej w miejscu zlikwidowanego gniazda. Na ścianach szczytowych i frontowych. Ze względów bezpieczeństwa skrzynki nie powinny wisieć nad chodnikami i oknami.	Na wysokości min. 3m. Odległość między skrzynkami ponad 4m. Najlepiej z wystawą północną lub wschodnią.	Przez cały rok, najlepiej jednak jesienią lub wczesną wiosną.
D – kawka		Na wysokości min. 9m. Odległość między skrzynkami może wynosić 1m. Najlepiej z wystawą północną lub wschodnią.	
J – jerzyk	W miejscu dotychczasowego otworu wlotowego do gniazda (w większości przypadków będzie to ściana szczytowa budynku tuż nad lub pod otworami prowadzącymi do stropodachu). Ze względów bezpieczeństwa skrzynki nie powinny wisieć nad chodnikami i oknami.	Na wysokości min. Drugiego piętra. Ważne jest by bezpośrednio pod skrzynką była pozostawiona wolna przestrzeń min. 5m, by ptaki miały swobodny dołot do gniazda. Ponieważ jerzyki gniazdują kolonijnie należy wieszać od kilku do kilkunastu skrzynek obok siebie.	Najlepiej tuż przed przylotem jerzyków (koniec kwietnia, początek maja) lub w czerwcu i lipcu, kiedy młode ptaki poszukują miejsc na przyszły sezon lęgowy.
F - pustułka	Najlepiej w miejscu zlikwidowanego dotychczasowego gniazda lub w bliskim sąsiedztwie takiego miejsca na ścianach szczytowych. Można montować je także w okienkach strychowych wewnątrz budynku. Ze względów bezpieczeństwa skrzynki nie powinny wisieć nad chodnikami i oknami.	Na wysokości min. 15m. Odległość pomiędzy skrzynkami powinna wynosić co najmniej 20 – 30m. Najlepiej z wystawą północną i wschodnią.	Przez cały rok. Najlepiej jednak w marcu, kiedy dorosłe ptaki szukają miejsc, w których przystąpią do lęgów, bądź w lipcu, kiedy młode ptaki mogą interesować się skrzynkami z myślą o przyszłych sezonach lęgowych.